

沖縄県より、 セグロウリミバエまん延防止対策に関するお知らせ

- 国内未発生の害虫であるセグロウリミバエが確認されております。
- セグロウリミバエの誘殺や発生が確認された地域では、当害虫に対して、以下の農薬を使用して防除が行えます。
- セグロウリミバエに対する農薬の散布についてのご相談や疑わしい虫を発見した際は、沖縄県病害虫防除技術センターへご連絡ください。

※下記農薬はセグロウリミバエに対して登録はありませんが、植物防疫法第29条第1項の規定による防除を行うために使用する農薬として、使用が可能です。
※また、下記希釈倍率、使用方法、使用時期、散布量、回数を守ることで、出荷停止等、流通に支障が出ることもありません。

【使用農薬リスト】

〇にがうり

農薬名	希釈倍率	使用方法	使用時期	散布量	本剤の使用回数	総使用回数	農薬の種類
ダントツ水溶剤	2,000倍	散布	収穫前日まで	100～300L	3回以内	4回以内 (定植時の土壌混和は1回以内、散布は3回以内)	クロチアニジン水溶剤
協友ダントツ水溶剤	2,000倍	散布	収穫前日まで	100～300L			
アルバリン顆粒水溶剤	2,000倍	散布	収穫前日まで	100～300L	2回以内	3回以内 (定植時の土壌混和は1回以内、散布は2回以内)	ジノテフラン水溶剤
スタークル顆粒水溶剤	2,000倍	散布	収穫前日まで	100～300L			
ホクコースタークル顆粒水溶剤	2,000倍	散布	収穫前日まで	100～300L			
三井東圧アルバリン顆粒水溶剤	2,000倍	散布	収穫前日まで	100～300L			

〇きゅうり

農薬名	希釈倍率	使用方法	使用時期	散布量	回数	総使用回数	農薬の種類
ダントツ水溶剤	2,000倍	散布	収穫前日まで	100～300L	3回以内	4回以内 (育苗期の株元処理及び定植時の土壌混和は合計1回以内、散布及び定植後の株元散布は合計3回以内)	クロチアニジン水溶剤
協友ダントツ水溶剤	2,000倍	散布	収穫前日まで	100～300L			
アルバリン顆粒水溶剤	2,000倍	散布	収穫前日まで	100～300L	2回以内	4回以内 (育苗期の株元散布及び定植時の土壌混和は合計1回以内、定植後の株元散布は1回以内、散布は2回以内)	ジノテフラン水溶剤
スタークル顆粒水溶剤	2,000倍	散布	収穫前日まで	100～300L			
ホクコースタークル顆粒水溶剤	2,000倍	散布	収穫前日まで	100～300L			
三井東圧アルバリン顆粒水溶剤	2,000倍	散布	収穫前日まで	100～300L			

〇かぼちゃ

農薬名	希釈倍率	使用方法	使用時期	散布量	回数	総使用回数	農薬の種類
ダントツ水溶剤	2,000倍	散布	収穫3日前まで	100～300L	3回以内	4回以内 (定植時の土壌混和は1回以内、散布は3回以内)	クロチアニジン水溶剤
協友ダントツ水溶剤	2,000倍	散布	収穫3日前まで	100～300L			
アルバリン顆粒水溶剤	2,000倍	散布	収穫前日まで	100～300L	2回以内	3回以内 (定植時の土壌混和及び育苗トレイへの灌注は合計1回以内、散布は2回以内)	ジノテフラン水溶剤
スタークル顆粒水溶剤	2,000倍	散布	収穫前日まで	100～300L			
ホクコースタークル顆粒水溶剤	2,000倍	散布	収穫前日まで	100～300L			
三井東圧アルバリン顆粒水溶剤	2,000倍	散布	収穫前日まで	100～300L			

〇とうがん

農薬名	希釈倍率	使用方法	使用時期	散布量	回数	総使用回数	農薬の種類
ダントツ水溶剤	2,000倍	散布	収穫3日前まで	100～300L	3回以内	4回以内 (定植時までの処理は1回以内、定植後の散布は3回以内)	クロチアニジン水溶剤
協友ダントツ水溶剤	2,000倍	散布	収穫3日前まで	100～300L			

○すいか

農薬名	希釈倍率	使用方法	使用時期	散布量	回数	総使用回数	農薬の種類
ダントツ水溶剤	2,000倍	散布	収穫前日まで	100～300L	3回以内	4回以内 (定植時の土壌混和は1回以内、散布は3回以内)	クロチアニジン水溶剤
協友ダントツ水溶剤	2,000倍	散布	収穫前日まで	100～300L			
アルバリン顆粒水溶剤	2,000倍	散布	収穫7日前まで	100～300L	2回以内	4回以内 (育苗期の株元散布及び定植時の土壌混和は合計1回以内、定植後の株元散布は1回以内、散布は2回以内)	ジノテフラン水溶剤
スタークル顆粒水溶剤	2,000倍	散布	収穫7日前まで	100～300L			
ホクコースタークル顆粒水溶剤	2,000倍	散布	収穫7日前まで	100～300L			
三井東圧アルバリン顆粒水溶剤	2,000倍	散布	収穫7日前まで	100～300L			

○メロン

農薬名	希釈倍率	使用方法	使用時期	散布量	回数	総使用回数	農薬の種類
ダントツ水溶剤	2,000倍	散布	収穫前日まで	100～300L	3回以内	4回以内 (育苗期の株元処理及び定植時の土壌混和は合計1回以内、散布及び定植後の株元散布は合計3回以内)	クロチアニジン水溶剤
協友ダントツ水溶剤	2,000倍	散布	収穫前日まで	100～300L			
アルバリン顆粒水溶剤	2,000倍	散布	収穫3日前まで	100～300L	2回以内	3回以内 (育苗期の株元散布及び定植時の土壌混和は合計1回以内、散布は2回以内)	ジノテフラン水溶剤
スタークル顆粒水溶剤	2,000倍	散布	収穫3日前まで	100～300L			
ホクコースタークル顆粒水溶剤	2,000倍	散布	収穫3日前まで	100～300L			
三井東圧アルバリン顆粒水溶剤	2,000倍	散布	収穫3日前まで	100～300L			

○食用へちま

農薬名	希釈倍率	使用方法	使用時期	散布量	回数	総使用回数	農薬の種類
ダントツ水溶剤	2,000倍	散布	収穫前日まで	100～300L	3回以内	4回以内 (定植時までの処理は1回以内、定植後の散布は3回以内)	クロチアニジン水溶剤
協友ダントツ水溶剤	2,000倍	散布	収穫前日まで	100～300L			

○うり類（漬物用）

農薬名	希釈倍率	使用方法	使用時期	散布量	回数	総使用回数	農薬の種類
アルバリン顆粒水溶剤	2,000倍	散布	収穫前日まで	100～300L	2回以内	3回以内 (定植時の土壌混和は1回以内、散布は2回以内)	ジノテフラン水溶剤
スタークル顆粒水溶剤	2,000倍	散布	収穫前日まで	100～300L			
ホクコースタークル顆粒水溶剤	2,000倍	散布	収穫前日まで	100～300L			
三井東圧アルバリン顆粒水溶剤	2,000倍	散布	収穫前日まで	100～300L			

○ズッキーニ

農薬名	希釈倍率	使用方法	使用時期	散布量	回数	総使用回数	農薬の種類
アルバリン顆粒水溶剤	2,000倍	散布	収穫前日まで	100～300L	2回以内	4回以内 (定植時の土壌混和は1回以内、定植後の株元散布は1回以内、散布は2回以内)	ジノテフラン水溶剤
スタークル顆粒水溶剤	2,000倍	散布	収穫前日まで	100～300L			
ホクコースタークル顆粒水溶剤	2,000倍	散布	収穫前日まで	100～300L			
三井東圧アルバリン顆粒水溶剤	2,000倍	散布	収穫前日まで	100～300L			

○まくわうり

農薬名	希釈倍率	使用方法	使用時期	散布量	回数	総使用回数	農薬の種類
アルバリン顆粒水溶剤	3,000倍	散布	収穫3日前まで	100～300L	2回以内	2回以内	ジノテフラン水溶剤
スタークル顆粒水溶剤	3,000倍	散布	収穫3日前まで	100～300L			
ホクコースタークル顆粒水溶剤	3,000倍	散布	収穫3日前まで	100～300L			
三井東圧アルバリン顆粒水溶剤	3,000倍	散布	収穫3日前まで	100～300L			

【連絡先】

沖縄県病害虫防除技術センター Tel：098-886-3880